

BOLI SI TRATAMENTE RECOMANDATE

PRODUSELE TRANSFER FACTOR™ NU SE IAU SEARA!!!

FUMATORI – **TF Plus** 2/zi; 1-1 } ambele de 2,3x/an
TF Riovida 30ml/zi, dimineata }

COPII 4-10 ani (preventiv) – **TF Trifactor** 2/zi; 1-1 } cate o luna amandoua sau
TF Masticable 2/zi; 1-1 } separat de 3,4x/an

ADULTI (preventiv) – **TF Trifactor** 2/zi; 1-1 } se ia 1-2 luni, de 2-3x /an
TF Riovida 30 ml/zi impreuna cu **TF Trifactor** daca se doreste
un rezultat si mai bun

A.D.H.D. – (deficit de atentie, deficit de limbaj si hiperactivitate)
TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua 4-5 luni dupa care se
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } continua cu **TF Trifactor** 2/zi; 1-1 si
} **TF ReCall** 1/zi – nu se garanteaza rezultatul
} acesta depinzand de le individ la individ

ADMINISTRARE ANTIBIOTICE LA COPII SUB 10 ANI -

ALERGII ALIMENTARE LA COPII SUB 10 ANI -

TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iua amandoua 3-4 luni dupa care se ia
TF Riovida 30ml 2x/zi } **TF Plus** 2/zi; 1-1 si **TF Riovida** 30ml/zi
Probiotico (pt. flora intestinala) } din plafar sau farmacii

ACCIDENT VASCULAR – **TF BCV** 6/zi; 2-2-2 } se iau amandoua 1-3 luni
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } dupa care se scade doza

ACNEE LA NIVELUL PIELII – **TF Riovida** 30 ml 2x/zi } toate trei 2-3 luni
(fara lactate) **TF Plus** 3/zi; 1-1-1 }
TF RenewAll local }

ALERGII - TF Trifactor } 3-6/zi; 1-1-1 sau 2-2-2 in functie de cat de puternica
sau TF Plus } este alergia

AMIGDALITA OPERATA – TF Plus 3/zi; 1-1-1

ASTM BRONIC INFANTIL – TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } se ia 2-3 luni, dupa care
daca se simte mai bine ia 2/zi pentru prevenire

ASTROCITOM ANAPLAZIC – TF Plus 9/zi; 3-3-3 } se iau amandoua mai multe
(tumoare cerebrala) TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } luni

AUTISM – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua mai multe luni se urmareste
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } reactia pacientului

BILA LENESA – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau ambele 2-3 luni si se urmareste
TF Riovida 30ml de 2x/zi } evolutia

BOALA BEHCET – TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } ambele timp de 3-4 luni dupa care se
TF Riovida 30ml 3x/zi } continua preventiv cu TF Trifactor 2/zi

BRONSIOLITA ASMATIFORMA – TF Trifactor 2/zi; 1-1 } se ia timp de 3 luni
} dupa care preventiv 1/zi

BRONSITA ASMATIFORMA – TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 timp de 2 luni si apoi in
continuare 2/zi; 1-1

CANCER – TF Riovida 30ml de 3x/zi (ultima data nu mai tarziu de 17:00)
TF Plus 6/zi; 2-2-2 (operat) si 9/zi 3-3-3 (neoperat)
Se iau amandoua 2,3 luni sau mai mult in functie de boala si pacient si
obligatoriu in timpul chimioterapiei

CANCER LA COLON (OPERAT) – TF Riovida 30ml/zi } se iau amandoua 3 luni,
TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se face pauza 2-3 luni,
} se iau din nou 3 luni, etc.

CANCER LA FICAT (COPII) – HEPATOBLASTOM –

TF Plus 6/zi; 3-3-3 } se iau cel putin 2-3 luni sau atat
TF Riovida 30 ml 3x/zi } cat este nevoie

CANDIDA } TF Plus 6/zi; 2-2-2
HELICOBACTER } TF Riovida 30ml de 2x/zi
GASTRITA } Digestive enzymes

CHISTURI OVARIENE – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } cel putin 3-4 luni (se poate si 7-8)
TF Riovida 30ml 2x/zi }
TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 } se ia incepand cu a doua luna

CHIST TRICHILEMAL FISTULIZAT REGIUNE INGHINALA DREAPTA OPERAT -

- TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } toate 2 luni dupa care se iau
TF Belle Vie 5/zi; 2-2-1 } TF Plus 2/zi; 1-1 si
TF Riovida 30ml 2x/zi } TF Belle Vie 2/zi; 1-1

CISTITA (RADICA) – TF Plus 3/zi; 1-1-1 { amandoua cel putin 2 luni
(cancer col uterin - radiere cu cobalt) TF MalePro 3/zi; 1-1-1 {

CONDILOAME GENITALE BARBATI -

TF Riovida 30ml 3x/zi } amandoua timp de
RiteStart Men 3 plicuri/zi } 4-5 luni

CONJUNCTIVITA ALERGICA } TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } se ia timp de 2-3 luni dupa
} care se ia TF Plus 3/zi; 1-1-1

COLESTEROL – TF BCV 3/zi; 1-1-1 } se ia impreuna cu Riovida si Plus 3 luni
TF Riovida 30ml de 2x/zi } se ia in prima luna
TF Plus 3/zi; 1-1-1 } inlocuieste Riovida in lunile 2 si 3

CONSTIPATIE - TF Riovida 30ml de 2,3x/zi (ultima data nu mai tarziu de 17:00)

CONSTIPATIE } - TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } amandoua cel putin
LIPSA POFTA DE MANCARE } - TF Riovida 30ml 2x/zi } 3 luni

DEREGLARI MENSTRUATIE – } TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 (partea genitala)
FIBROM } TF Riovida 30 ml 2x/zi (dezintoxicare)
} TF Plus 3/zi; 1-1-1 (cresterea imunitatii)

DERMATITA PERIORALA - TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se iau primele doua 2-3
(posibil de la candida) TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 } luni dupa care se iau
RenewAll – zone afectate } TF Trifactor 2/zi; 1-1 si TF
} Riovida 30ml/zi

DIABET – TF Glucoach 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua timp de 3 luni
TF Riovida 30ml 2x/zi }

DIABET COPII – TF Glucoach 1/zi } se ia cam 3 luni pentru diabet 2-lipsa crom
} si se schimba cu TF Plus pentru diabet 1-
} lipsa zinc impreuna cu TF Trifactor dupa
} care se iau amandoua 1/zi
TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se ia cam 3 luni dupa care se ia 1/zi
TF Riovida 30ml/zi } se ia in completare la TF Glucoach

DIAREE – TF Plus 3,4 de 2x/zi timp de 3-4 zile si in plus de la Plafar se cere ceva
pentru refacerea florei intestinale

“DOWN” – SINDROMUL ... - TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } se iau amandoua timp
Sau TF Masticable 6/zi; 2-2-2 } de 6 luni, dupa care se
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } continua cu TF Trifactor
} 2/zi; 1-1 si TF ReCall
} 2/zi; 1-1

DROGURI – TF Plus 2/zi; 1-1 } ambele cel putin 3 luni
TF Riovida 30 ml 3x/zi }

EDEM QUINKE(ANGIOEDEM RECURENT) – TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } prima
TF Riovida 30ml 2x/zi } luna
TF Plus 6/zi; 2-2-2 } a doua luna
TF Riovida 30ml 2x/zi } si alte 2-3

ENDOMETRIOZA: TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } Toate trei cel puțin 3 luni iar dacă analizele
TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 } arată o îmbunătățire evidentă, să se ia câte
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } 2 din fiecare încă 2 luni și apoi preventiv
} câte 1/zi din fiecare

ERIZIPEL (infecție musculară, tegumente) – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } toate cel puțin 3-4 luni
CIRCULAȚIE PROASTĂ } TF BCV 4/zi; 2-1-1 }
LA BĂTRANI (cauza = streptococul) } TF Riovida 30ml 2x/zi }

FEMEI ÎNSĂRCINATE – TF Trifactor 1/zi

FIBROMIALGIE (OBOSEALA) – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } toate trei cel puțin
TF Riovida 30ml de 2x/zi } o lună; 1-3 luni
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 }

FIBROM UTERIN – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } toate trei timp de 3-4 luni după care
TF Belle Vie 6/zi; 2-2-2 } se continuă preventiv cu TF Plus 2/zi;
TF Riovida 30 ml 2x/zi } și TF Belle Vie 2/zi; 1-1

FICAT GRAS - TF Riovida 30ml 3x/zi; iar dacă problema pleacă de la pancreas și
TF Glucoach 3/zi; 1-1-1

GLIOBLASTOM – TF Riovida 30 ml 2x/zi } se iau amândouă 2-3 luni
(tumoră malignă sistem nervos central) TF Plus 9/zi; 3-3-3 }
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } se ia începând cu a doua lună

HEPATITA B sau C – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } amândouă 2-3 luni după care
TF Riovida 30ml de 2x/zi } dacă se simte mai bine se ia
TF Plus 3/zi 1-1-1

HERPES – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau amândouă cel puțin 3 luni
TF Riovida 30 ml de 2x/zi }

HIDRONEFROZA STANGA GRADUL II-III PRIN - TF Riovida 30ml 2x/zi
DISFUNCTIE CONGENITALA DE JONCTIUNE - TF Plus 3/zi; 1-1-1
PIELOURETERALA - TF MalePro 6/zi; 2-2-2
RINICHI IN POTCOAVA } toate 2-3 luni

HIPERTENSIUNE – TF BCV 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua 2,3 luni
TF Plus 3/zi; 1-1-1 }

HODGKIN (BOALA) – TF Plus 9/zi; 3-3-3 } se iau amandoua 2-3 luni
(cancer ganglionar) TF Riovida 30 ml de 3x/zi }

HPV – CONDILOMA ACUMINATA – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau amandoua
(leziuni pe suprafata interna a canalului anal) TF Riovida 30 ml de 2x/zi } 3-4 luni, dupa care
} se ia preventiv
} TF Trifactor 2/zi; 1-1

INFECTIE URINARA – BEBELUSI – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se ia timp de 2 luni
} dupa care pentru prevenire
} se ia TF Plus 1/zi

INFECTIE URINARA SI PROSTATITA CRONICA BACTERIANA LA ADULTI

TF Plus 3/zi; 1-1-1 } toate trei cel putin 3 luni
TF MalePro 3/zi; 1-1-1 } dupa care se iau TF Plus
TF Riovida 30ml 2x/zi } 2/zi si TF MalePro 2/zi

INTOLERANTA LA PROTEINELE LAPTELUI DE VACA - TF Trifactor 6/zi; 2-2-2
IMUNITATE FOARTE SCAZUTA } se ia timp de 3 luni dupa
HIPERACIVITATE BRONSICA } care se ia 2/zi; 1-1

ECOLI (INFECTIE URINARA) - TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } se iau toate trei cel
ADENOM DE PROSTATA - TF MalePro 5/zi; 2-2-1 } putin 3 luni
FIEREA LENESA SI FICAT MARIT - TF Riovida 30ml de 3x/zi }

INFERTILITATE MASCULINA – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau toate trei cel
TF MalePro 3/zi; 1-1-1 } putin 3 luni
TF Riovida 30ml de 2x/zi }

IMUNOMODULATOR (COPII) – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } amandoua timp de 2 luni
TF Riovida 30ml/zi }

INSOMNIE – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } ambele 2-3 luni dupa care se continua cu
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } TF ReCall 2/zi; 1-1

KERATITA HERPICA (RETINA) – TF Riovida 30ml 2x/zi } cel putin 2 luni

LUPUS – TF Trifactor dupa cum urmeaza } 3/zi; 1-1-1 in prima luna
} 6/zi; 2-2-2 urmatoarele 2-4 saptamani
} 9/zi; 3-3-3 in a treia luna
} apoi preventiv 2/zi; 1-1

MIXEDEM CONGENITAL – TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } se iau toate trei cel putin
TF Glucoach 3/zi; 1-1-1 } 3 luni dupa un tratament
TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } cu TF Plus de 4-5 luni

NAS INFUNDAT (COPII) TF Trifactor sau } cel putin 2 luni dupa care
TF Masticable 3/zi; 1-1-1 } preventiv 1/zi

NODULI LA SANI – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau toate trei cel putin 3 luni
TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 }
TF Riovida 30 ml de 2x/zi }

OASE (PROBLEME) – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau toate 2-3 luni de
TF Riovida 30ml 2x/zi } 2 ori pe an si depinde de
RiteStart 2/zi; 1-1 (in timpul meselor) } stadiul bolii

PARADONTOZA – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau timp de 2-3 luni, cu specificatia ca
TF BCV 3/zi; 1-1-1 } acest tratament a dat rezultate la cei carora
Spray 6-7x/zi } inca nu le-au cazut dintii

POLIARTRITA REUMATOIDA – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua in jur
TF Riovida 30ml de 2x/zi } de 3 luni

PSORIASIS – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1
TF Riovida 30ml de 2x/zi
TF RenewAll se aplica de 2x/zi pe zonele afectate

PAPILLOMA VIRUS – HPV – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau amandoua
(TF Belle Vie se ia pt. depurarea organelor genitale) TF Belle Vie 3/zi; 1-1-1 } 2-3 luni

PAPILLOMA VIRUS – HPV – TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua
(pentru barbati) TF Riovida 30ml 2x/zi } 2-3 luni
TF MalePro 3x/zi; 1-1-1 – impreuna cu celelalte doua
pentru rezultate si mai bune

PIELONEFRITA ACUTA CRONICA – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } ambele se iau cam 3
BILATERALA (RINICHI) TF MalePro 3/zi; 1-1-1 } luni

REUMATISM – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } amandoua cel putin trei luni
TF Riovida 30ml 2x/zi }

RACELI } TF Trifactor sau TF Masticable 3-6/zi; 1-1-1 sau 2-2-2
SINUZITA } pt. copii } daca este mai grav
PNEUMONIE }

RINICHI IN DIALIZA – TF Riovida 30ml/zi } toate trei cam 3 luni dupa care se
TF Plus 3x/zi; 1-1-1 } continua cu TF Plus si TF MalePro
TF MalePro 3x/zi; 1-1-1 } inca cateva luni

RINICHI DREPT EXTIRPAT – TF Riovida 30ml 2x/zi } ambele timp de 4-5 luni
(suspect de metastaza) TF Plus 9/zi; 3-3-3 }

SCLERODERMIE SISTEMATICA - TF Riovida 30ml 2x/zi } toate trei timp de
(boala autoimuna – se usuca organele interioare) TF Plus 3/zi; 1-1-1 }
TF BCV 2x/zi; 1-1 }

SCLEROZA (MULTIPLA) LATERALA AMIOTROFICA

TF Plus 6/zi; 2-2-2 } toate trei timp de 2-3 luni pentru a se vedea
TF Riovida 30ml de 2x/zi } primele rezultate
TF ReCall 6/zi; 2-2-2 }

SINUZITA CRONICA – TF Plus 6/zi; 2-2-2 o perioada de 2,3 luni dupa care se ia
pentru prevenire TF Trifactor 2/zi; 1-1

SISTEM NERVOS CENTRAL – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau ambele cel putin 3-4
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 } luni dupa care se iau cate 1/zi

SPONDILITA ANCHILOZANTA - TF Plus 6/zi; 2-2-2 } aceasta este schema
(spondilita anchilopoetica) TF Riovida 30ml 2x/zi } pentru primele 2 luni
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 }

STAFILOCOCC AURIU – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau ambele cam 2-3 luni
TF Riovida 30 ml 2x/zi }

STREPTOCOC BETA-HEMOLITIC TIP A – TF Plus 6/zi; 2-2-2 } se iau ambele 3
(ASLO dublu si chiar mai mult) TF Riovida 30 ml 3x/zi } luni dupa care se
} ia TF Trifactor 3/zi
} 1-1-1

STREPTOCOC BETA HEMOLITIC GRUPUL B – SEX FEMININ

TF Belle Vie 5/zi; 2-1-1 } toate trei cel putin 3 luni
TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 }
TF Riovida 30 ml 2x/zi }

STREPTOCOC BETA HEMOLITIC GRUPUL B – SEX MASCULIN

TF MalePro 5/zi; 2-1-1 } toate trei cel putin 3 luni
TF Plus 3/zi; 1-1-1 }
TF Riovida 30 ml 2x/zi }

STRES SI OBOSEALA CRONICA - TF Trifactor 2x/zi } se incepe cu TF Trifactor 2
TF Riovida 30ml/zi } saptamani se continua cu TF
RiteStart 1x/zi } Riovida 2 saptamani si se
} repeta in cea de a doua luna
} RiteStart se ia pe toata perioada de 2 luni cate un pachet pe zi

TIROIDA AUTOIMUNA - HASHIMOTO - TF Riovida 30ml 3x/zi } toate trei timp de 3-4 luni
TF Plus 3/zi; 1-1-1 } iar daca analizele ies bune se
} continua cu TF Trifactor 2/zi; 1-1
} sau pentru copii TF Masticable 3/zi; 1-1-1

TIROIDA AUTOIMUNA - HIPOTIROIDISM - TF Riovida 30ml 2x/zi } toate trei timp de 3-4 luni
TF Plus 6/zi; 2-2-2 } dupa care se mentine cu
TF ReCall 6/zi; 2-2-2 } TF Trifactor 2/zi; 1-1

TROMBOCITOPENIE - TF Plus 3/zi; 1-1-1 } primele doua cel putin 3 luni
TF Riovida 30ml 2x/zi }
TF BCV 2/zi 1-1 } din a 3-a luna de tratament

TROMBOCITOPENIE IDIOPATICA - TF Plus 5/zi; 2-2-1 } ambele timp de 3 luni
(scaderea trombocitelor in sange) TF BCV 6/zi; 2-2-2 } dupa care cate una/zi
} din fiecare

TROMBOFLEBITA - TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua 2-3 luni
TF BCV 3/zi; 1-1-1 }

TUBERCULOZA (TBC) - TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau amandoua 3 luni dupa care
TF Riovida 30ml 2x/zi } se ia TF Plus 2/zi; 1-1 si
} TF Riovida 30ml/zi

TUMOARE RENALA GRAVITZ - TF Plus 9/zi; 3-3-3 } amandoua timp de 4-5
TF Riovida 30ml 3x/zi } luni, dupa care urmeaza
} alt tratament indicat
} ulterior

VALVA BLOCATA – TF Plus 3/zi; 1-1-1 } se iau toate trei cat se poate de mult
TF BCV 3/zi; 1-1-1 } dar nu se garanteaza rezultatele pt.
TF Riovida 30ml 2x/zi } ca este o problema chirurgicala

VARICE, CIRCULATIE PROASTA, TENSIUNE MICA –

TF BCV 3/zi } ambele cel putin 3 luni dupa care se iau
TF Riovida 30ml 3x/zi } TF BCV 1/zi si TF Riovida 30ml/zi

VITILIGO (DEPIGMENTARE) – TF Riovida 30ml 2x/zi } ambele cam 3 luni dupa
TF Trifactor 3/zi; 1-1-1 } care se ia doar TF Trifactor
RenewAll – local } 3/zi

WHIZZING RECURENT – TF Trifactor 6/zi; 2-2-2 } timp de 2 luni si apoi in
} continuare 2/zi; 1-1

ZONA ZOSTER – TF Riovida 30ml de 2x/zi } se iau toate trei cam 2-3 luni
TF Plus 3/zi; 1-1-1 }
TF ReCall 3/zi; 1-1-1 }

PENTRU ANIMALE

TUMOARE LA RINICHI – TF Plus 9/zi; 3-3-3 } timp de 3-4 luni
(pentru pisici)

PENTRU PORUMBEI CALATORI – TF Trifactor - 1 capsula la 2 zile